

EDADES

Encuesta sobre alcohol y drogas en España

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad

Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas

Madrid, 3 de marzo de 2015

Aspectos generales

→ Antecedentes:

- Desde **1995**, el Plan Nacional sobre Drogas realiza, **cada dos años**, una Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España en población general residente en **hogares (15-64 años)**. Los resultados son representativos a nivel nacional.

→ Muestra:

- **23.136** cuestionarios válidos.

→ Objetivos:

Obtener información útil para **diseñar y evaluar políticas** dirigidas a **prevenir el consumo y los problemas derivados del uso de drogas**.

- Conocer las **características sociodemográficas** de los consumidores y patrones de consumo así como la **disponibilidad de drogas percibida** y el **riesgo percibido** ante diversas conductas de consumo.
- Conocer las **vías de obtención y vías de información** utilizadas y preferidas.
- Conocer la opinión de la población acerca de la **importancia de los problemas de drogas** y las **medidas para reducirlos**.

→ Módulos específicos:

- Este año se han introducido el **módulo de nuevas sustancias**, y el **de consumo problemático de cannabis**. Así mismo se ha investigado el consumo de drogas en el ámbito laboral que presentaremos en breves fechas.
- Igualmente y por primera vez, se han introducido preguntas que permiten **calcular la incidencia de nuevos consumidores** de ciertas drogas.


Distribución muestral por CCAA

CCAA	PNSD	Ampliación	Realizadas
Andalucía	2.155		2.155
Aragón	858		858
Asturias	778		778
Baleares	812		812
Canarias	1.084	813	1.897
Cantabria	576	408	984
Castilla La Mancha	1.071	516	1.587
Castilla y León	1.181		1.181
Cataluña	2.019		2.019
C. Valenciana	1.699	798	2.497
Extremadura	788		788
Galicia	1.236	754	1.990
Madrid	1.930		1.930
Murcia	911		911
Navarra	604		604
País Vasco	1.108		1.108
La Rioja	420		420
Ceuta	218		218
Melilla	211	188	399
Total	19.659	3.477	23.136

Evolución tamaño de muestra


Fortalezas EDADES:

1. Amplia muestra
2. Serie histórica periódica y dilatada
3. Flexibilidad: Módulos específicos
4. Comparabilidad internacional



Proporción consumidores drogas

Últimos 12 meses



➔ Se incluyen en el cuestionario un total de **23 drogas**.


➔ Las sustancias consumidas por un mayor porcentaje de personas son **el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes**.

Proporción consumidores drogas

Últimos 12 meses



➔ Desde 2011 aumenta ligeramente el consumo de las sustancias legales: tabaco, alcohol e hipnosedantes.

➔ Disminuye ligeramente el consumo de las sustancias ilegales.



Proporción consumidores drogas

Últimos 12 meses, según sexo



→ El consumo de **drogas tanto legales como ilegales** está **más extendido entre los hombres**, excepto los hipnosedantes donde la proporción de mujeres consumidoras duplica a la de varones.

Proporción consumidores drogas


Últimos 12 meses, según edad



15-17




18-64



Edad media inicio en el consumo


La **edad media** de inicio en el consumo de las diferentes drogas se mantiene **estable** con respecto a ediciones anteriores de la encuesta



Consumo de tabaco



→ **Tendencia estable** de la prevalencia de consumo **diario** de **tabaco** en todos los rangos de edad y en ambos sexos.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Alguna vez en la vida	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75	71,7	73,1
Últimos 12 meses	46,8	44,7	46	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7
Últimos 30 días	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3
Diariamente en los últimos 30 días	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8
Edad media inicio en el consumo	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4
Edad media inicio en el consumo diario de tabaco							19,3	18,5	18,6

Consumo de bebidas alcohólicas




→ Las tendencias de consumos de bebidas alcohólicas en los últimos 10 años se encuentran estabilizadas pero en niveles elevados.





	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Alguna vez en la vida	90,6	87,3	89	88,6	93,7	88	94,2	90,9	93,1
Últimos 12 meses	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3
Últimos 30 días	64	61,8	63,7	64,1	64,6	60	63,3	62,3	64,4
Diariamente en los últimos 30 días	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11	10,2	9,8
Edad media de inicio en el consumo	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,7

Consumo de bebidas alcohólicas




- La prevalencia de **borracheras** muestra una tendencia **estable**. **2 de cada 10** personas se han emborrachado en el último año.
- El **15,5%** de la población de 15 a 64 años ha consumido **alcohol en atracón** en el último mes. Las mayores prevalencias se encuentran en el grupo de los adultos jóvenes de **15 a 29 años**
- El **botellón** se concentra en el grupo de los adultos jóvenes de **15 a 24 años**



Consumo de bebidas alcohólicas



➔ En la población de 15 a 64 años, utilizando AUDIT, tienen un consumo **problemático de alcohol** el **4,9% de encuestados**, de los cuales presentan **consumo de riesgo** el **4,5%** (1.600.000 personas, 1.300.000 hombres y 300.000 mujeres) y presentan una posible **dependencia** el **0,4%** (120.000).




AUDIT	2009 (pob. general)	2013/14 (pob. general)
Consumo de riesgo de alcohol	4,6	4,5
Posible dependencia de alcohol	0,2	0,4

Consumo de hipnosedantes



→ Se observa una **tendencia creciente** desde 2005

→ El porcentaje de **mujeres** que consume **hipnosedantes** en el último año **duplica** el porcentaje de **hombres** consumidores (16 % frente a 8,5 %). Las diferencias **aumentan** con la **edad**.




	2005	2007	2009	2011	2013
Alguna vez en la vida	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2
Últimos 12 meses	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2
Últimos 30 días	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9
A diario o casi a diario en los últimos 30 días		3,1	2,7	4,6	6,8
Edad media de inicio en el consumo		33,8	34,5	34,5	35,2

Consumo de cannabis




- Las prevalencias de consumo de **cannabis** muestran una **tendencia levemente descendente**
- Los **hombres** consumen en **mayor proporción** que las mujeres en todos los grupos de edad

El número de personas (15-64 años) que realizan un consumo problemático* de cannabis es 687.000



CONSUMO PROBLEMÁTICO DE CANNABIS	
CAST ≥ 4	2013/14
Entre TODA la población de 15 a 64 años.	2,2




Consumo de cannabis




- Hacen consumo problemático de cannabis, el 2,2% de la población (15-64 años), la proporción no es constante y disminuye con la edad
- el 25% de los que han consumido en el último año presentan consumo problemático. Esta proporción es constante en todos los grupos de edad.


Porcentaje de consumidores de cannabis de riesgo* **entre la población general**, por grupos de edad. España 2013



Porcentaje de consumidores de cannabis de riesgo* **entre los que han consumido cannabis en el último año** (que contestan escala CAST), por grupos de edad. España 2013





Consumo de cocaína*



→ Se mantiene **tendencia descendente** del consumo iniciada en 2005.

La proporción de consumidores entre los **hombres es 3,5 veces mayor** que la observada entre las **mujeres.**

Últimos 12 meses según sexo




— Alguna vez en la vida
— Últimos 12 meses
— Últimos 30 días
— Edad media de inicio en el consumo

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Alguna vez en la vida	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7	8	10,2	8,8	10,2
Últimos 12 meses	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3	3	2,6	2,2	2,1
Últimos 30 días		0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0
Edad media de inicio en el consumo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0	21,3

Éxtasis, anfetaminas y alucinógenos




→ Se **consolida la tendencia descendente iniciada en 2001** para todos los consumos en ambos sexos. Son las cifras más bajas desde el comienzo de las encuestas



Consumo de heroína



→ Los consumos de **heroína** detectados a partir de la encuesta, no muestran cambios con respecto a las ediciones previas.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
— Alguna vez en la vida	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7
— Últimos 12 meses	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
— Últimos 30 días		0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
— Edad media de inicio en el consumo	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7	21,5

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
— Alguna vez en la vida	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7
— Últimos 12 meses	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
— Últimos 30 días		0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
— Edad media de inicio en el consumo	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7	21,5


Nuevas sustancias

Edad: mayor consumo entre 25-34 años.

Sexo: mayor consumo en hombres.

Consumo: experimental

El 74,1% de las personas **nunca han oído hablar de estas drogas**





*Incluye sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales y que se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, inciensos... Se encuentran incluidas todas las especificadas en el gráfico y otras por cuyo consumo no se pregunta de manera independiente en el cuestionario EDADES 2013/2014.

Nuevas sustancias

Policonsumo: El **78%** de los consumidores de NS lo hace en situación de **policonsumo** experimental (**5 o más sustancias**)

Drogas ilegales: El **69,2%** de los consumidores de NS han consumido **drogas ilegales** frente al **8,2%** de los que no han consumido NS

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas** entre los consumidores de nuevas sustancias alguna vez en la vida




EDADES 2013/2014. USID. DGPNSD. MSSSI

*Drogas ilegales: Cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína.

**Alcohol, tabaco, hipnosedantes, cánnabis, cocaína en polvo, base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables

Policonsumo


Últimos 12 meses, según sexo



Últimos 12 meses


En los últimos 12 meses un **13,6%** no han consumido **ninguna sustancia**

El % de mujeres que no consumen casi duplica al de hombres



- Ninguna sustancia
- Una sola sustancia
- Dos sustancias
- Tres sustancias
- Cuatro sustancias
- Cinco o más sustancias


El **cánnabis** está presente en el **90%** de los policonsumos de sustancias ilegales



Policonsumo y binge drinking

→ El alcohol está presente en el **90 % de los policonsumos**.


→ El consumo de alcohol, sobre todo si es de tipo intensivo (**binge drinking** e intoxicaciones etílicas) se **asocia** con una **mayor prevalencia de consumo de otras drogas**.



Incidencia anual

- En el último año previo a la encuesta comenzaron a consumir cannabis 168.677 personas (5,3 por cada mil encuestados), tabaco 142.282 (4,4/1.000) y cocaína en polvo 38.551 (1,2/1.000)
- El número de personas que empezaron a consumir cannabis supera a las que se iniciaron en el consumo de tabaco.

Incidencia anual de consumo de sustancias psicoactivas en población de 15 a 64 años (tasa por 1000 habitantes y número de personas). España 2013.




*Total estimado en base a número de casos según sexo.

Incidencia anual

→ En el último año previo a la encuesta comenzaron a consumir cannabis 168.677 personas (5,3 por cada mil encuestados), tabaco 142.282 (4,4/1.000) y cocaína en polvo 38.551 (1,2/1.000)

→ El número de personas que empezaron a consumir cannabis supera a las que se iniciaron en el consumo de tabaco.

Incidencia anual de consumo de sustancias psicoactivas en población de 15 a 64 años (tasa por 1000 habitantes y número de personas). España 2013.




*Total estimado en base a número de casos según sexo.

Incidencia anual cannabis

→ La mayor tasa de personas que empiezan a consumir cannabis se da en menores de edad. En el año previo a la encuesta, empezaron a consumir cannabis 61.085 menores (47 por cada mil personas de 15 a 17 años).

Incidencia anual de consumo de cannabis, según grupos de edad y sexo.
(tasa por 1000 habitantes y número de personas). España 2013.




*Total estimado en base a número de casos según sexo.

Riesgo percibido

→ **Baja el riesgo percibido** ante el consumo de ciertas **drogas**

→ **Mayor riesgo percibido por mujeres** que por hombres para todas las sustancias, excepto para hipnosedantes


→ Persiste la consideración del **tabaco** como **más peligroso** que el **cannabis**



Disponibilidad percibida


→ **Disminución** de la disponibilidad percibida para todas las drogas

→ Tendencia iniciada en **2009**.



Acciones contra las drogas


Para los ciudadanos, las **medidas de mayor eficacia** para resolver el problema de las drogas son:
Acciones formativas, tratamiento, control policial y restricción legal, y campañas publicitarias



Acciones contra las drogas

→ **Tendencia estable** en el porcentaje de personas que considera que es muy importante la legalización del cannabis y descenso en lo que se refiere a todas las drogas


Porcentaje de la población (15-64 años) que considera como "muy importante" para resolver el problema de las drogas la legalización de todas las drogas y del cannabis España, 1995-2013



Acciones contra las drogas

→ La importancia que se da a la legalización del cannabis, es relativamente constante, independientemente de la edad

Porcentaje de personas de 15 a 64 años (por grupos de edad) que valoran como "muy importante" la legalización del cannabis par resolver el problema de las drogas. España 2013




Acciones contra las drogas


→ Consideran más importante la legalización del cannabis aquellas personas que lo consumen especialmente las que hacen consumo problemático. **Casi 9 de cada 10 personas que hacen un consumo problemático* de cannabis consideran que su legalización es algo/muy importante.**

Porcentaje de personas que creen que la legalización de cannabis es una medida nada/algo o muy importante, según su consumo de cannabis. España 2013.


No han consumido cannabis en el último año



Han consumido cannabis en el último año (no consumo problemático*)



Han consumido cannabis en el último año (si consumo problemático*)



■ Nada importante

■ Algo importante

■ Muy importante

■ NS/NC

*Consumo problemático: CAST (Cannabis Abuse Screening Test) ≥ 4

Información sobre las drogas

La población muestra mucho interés en recibir información a través de **los medios de comunicación, internet, los profesionales sanitarios, los profesores y charlas o cursos**

